



PANNE DE POMPE A INSULINE



« Ma pompe à insuline est en panne ! »

→ « J'appelle immédiatement mon prestataire »

ACTIS-SANTE	03.83.49.93.93.
ARAILLOR	03.83.51.10.63.
GENERIMED	03.87.38.91.00.
LVL Médical	03.87.38.21.21.
ORKYN	0800.350.450 de 9 à 19 h 03.83.80.47.60 de 19 à 9 h
VITALAIRE	0820.820.199.

► Mon prestataire peut me dépanner en moins de 3 heures

- Je surveille ma glycémie toutes les heures
- Si elle dépasse 2 g/l, je m'injecte de 2 à 4 Unités d'insuline ANALOGUE RAPIDE (NOVORAPID® ou HUMALOG® ou APIDRA®) avec un stylo à insuline

► Un dépannage dans les 3 heures n'est pas possible

- Je dois mettre en place un schéma de remplacement



1. Je m'injecte **immédiatement et quelque soit l'heure**, une dose d'insuline LANTUS® ou LEVEMIR® avec un stylo à insuline

- Cette dose est égale à la dose totale d'insuline injectée en débit de base par la pompe
 - cette dose est notée dans mon carnet de surveillance
 - je peux retrouver ce chiffre dans la fonction « BASAL » de la pompe (si je peux y accéder malgré la panne)
 - je peux calculer ce chiffre en additionnant tous les débits de base de la journée
- Cette injection de LANTUS® ou LEVEMIR® sera reconduite tous les jours à la même heure
- L'injection de LANTUS® ou de LEVEMIR® s'effectue de préférence dans les cuisses
- L'adaptation de cette dose de LANTUS® ou de LEVEMIR® s'effectue sur la glycémie à jeun selon les règles habituelles d'adaptation de l'insuline

2. Au moment des repas, je m'injecte, avec un stylo à insuline, de l'insuline ANALOGUE RAPIDE (NOVORAPID® ou HUMALOG® ou APIDRA®) en quantités égales à celles injectées en bolus par la pompe

- Les injections se font dans les bras ou le ventre, dans tous les cas, dans un site complètement différent de celui de la LANTUS® ou de LEVEMIR®
- L'adaptation des doses d'insuline rapide des repas s'effectue, comme pour les bolus, sur les glycémies obtenues après les repas, selon les règles habituelles d'adaptation de l'insuline



Lorsque mon prestataire me dépannera, je ne pourrai rebrancher ma pompe qu'à échéance de l'action de la LANTUS® ou de LEVEMIR®, soit 24 h après la dernière injection

