

Préparation cutanée de l'opéré

A Hautemaniere ¹², J Veloso¹, S Tousseul ¹


1 Équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière

2 Faculté de médecine université de lorraine

Service de chirurgie


PCO – veille et jour de
l'intervention

INFORMATION DU PATIENT




Cette thématique est conforme si le patient a reçu, avant son hospitalisation, une information écrite sur la préparation cutanée de l'opérée par le secteur de consultation.

ANTECEDENTS D'ALLERGIE




Cette thématique est conforme à condition que les antécédents d'ALLERGIE du patient soient vérifiés et pris en compte, la veille de l'intervention (sauf si ambulatoire).

HYGIENE CORPORELLE




L'HYGIENE CORPORELLE est conforme si la veille et le jour de l'intervention : une hygiène corporelle et un shampooing sont réalisés avec du produit antiseptique, les serviettes de toilettes et gants utilisés sont propres, une hygiène bucco-dentaire est effectuée (brossage et/ou bain de bouche)

PRODUITS UTILISES




La thématique PRODUITS est considérée comme conforme si l'ensemble des critères suivants sont respectés : la veille de l'intervention, l'utilisation d'un produit antiseptique adapté pour la toilette et tenant compte des allergies éventuelles du patient (dans ce cas précis, savon doux toléré), le jour de l'intervention, l'utilisation de ce même produit antiseptique (savon doux toléré si allergie) pour l'hygiène corporelle.

TENUE DU PATIENT ET LINGE



La TENUE du patient et le LINGE regroupe les actions suivantes : la veille de l'intervention, le patient porte un linge de nuit visuellement propre après la douche et s'installe dans des draps de lits propres, changés après la toilette. Le jour de l'intervention, le patient porte, après la douche, une chemise fendue propre, des surchaussures et une coiffe, puis s'installe dans des draps de lit propres.

MOMENT DE LA DEPILATION




Le moment de la DEPILATION est considérée comme conforme si l'ensemble des critères suivants sont respectés : la dépilation est réalisée le matin de l'intervention, entre les deux douches, à l'aide d'une tondeuse, de crème dépilatoire ou d'une paire de ciseaux (le rasoir est exclu).

Rasage



Rasage



Tonte

-

Dépilation



Tonte

-


Dépilation



Tolérée




VERIFICATIONS




Avant le départ au bloc, l'IDE effectue les VERIFICATIONS suivantes : préparations cutanée de l'opérée correcte, hygiène bucco-dentaire réalisée et absence de bijoux, de prothèses et de vernis à ongle).

TRACABILITE DES ACTES




LA TRACABILITE DES ACTES est considérée comme conforme s'il existe une traçabilité écrite de l'ensemble des gestes effectués la veille et le jour de l'intervention.



Secteur interventionnel


PCO – bloc opératoire

PREMIER BADIGEON




Cet item est conforme si le premier badigeon est réalisé au sein du bloc opératoire ou de la radiologie.

DETERSION DE LA PEAU




La DETERSION de la peau est respectée si le produit utilisé tient compte des antécédents allergiques du patient et s'il est identique au service de soins (utilisation de savon doux liquide toléré si et seulement si le patient est allergique)

RINCAGE - SECHAGE DE LA PEAU




Cette thématique est respectée si un rinçage à l'eau stérile suivi d'un séchage de la zone (spontané ou avec compresse) est réalisée entre la détergence et l'antisepsie de la peau.

ANTISEPSIE DE LA PEAU



L'ANTISEPSIE de la peau est conforme si le produit utilisé tient compte de la déterision de la peau (solution moussante de PVI puis PVI iodé demrique ouPVI alcoolique / solution moussante de chlorexidine puis chlorexidine alcoolique ou chlorexidine aqueuse / si patient allergique : savon doux liquide puis dérivé chloré)

DEUXIEME BADIGEON



Ce critère est conforme lorsqu'un deuxième badigeon est réalisé au bloc par l'équipe chirurgicale avec le même antiseptique.

Place des solutions avec applicateur

- Avis HAS : il n'y a pas de démonstration d'un avantage par rapport à la povidone iodée alcoolique et aux autres chlorhexidines alcooliques, dans la préparation cutanée du champ opératoire, la pose d'un cathéter veineux périphérique ou un autre geste médical invasif

iodophor-in-isopropyl alcohol solution



chlorhexidine 2 % / alcool isopropylique 70 %




Place du cyanoacrylate

PCO → Cyanoacrylate → incision




liquide formant une pellicule bactério isolante
sceller et immobiliser les bactéries de la flore
cutanée.




Avantage du Cyanoacrylate


- > **Fixe la flore cutanée.**
- > Protège contre les migrations de la flore cutanée dans la zone chirurgicale
- > Compatible avec les pratiques courantes
- > Compatible avec la plupart des techniques chirurgicales et matériaux courants
- > Retrait inutile pour la fermeture de la plaie ; disparaît naturellement en quelques jours
- > Peut être utilisé avec tous types de préparations et de champs à inciser
- > Ininflammable, non irritant et non cytotoxique
- > Sans latex



TRACABILITE DES GESTES



La TRACABILITE est conforme si l'ensemble des gestes effectués au bloc sont écrits dans le dossier du patient



L'EVALUATION au bloc opératoire synthétise le respect de l'ensemble des thématiques ci-dessus.